

Caimanes aguja: del conflicto a la coexistencia

Sergio A. Balaguera-Reina*

Tras años de declive, la recuperación de las poblaciones de caimanes aguja en el Caribe colombiano invita a repensar la relación de esta especie con las comunidades locales y los esfuerzos de conservación en la región.

Históricamente, los caimanes aguja (*Crocodylus acutus*) han habitado el Caribe colombiano desde la península de La Guajira hasta el golfo del Darién. En esta región han desempeñado no solo importantes roles ecosistémicos, como la regulación de poblaciones de invertebrados (*Cardisoma guanhumí*), peces (*Cathorops spixii*), aves (*Phoenicopterus ruber*), mamíferos (*Didelphis marsupialis*) y otros reptiles (*Iguana iguana*)², sino también culturales, como evidencia su incorporación en distintas cosmogonías indígenas³.

La transformación del paisaje para sostener el crecimiento de las poblaciones humanas ha producido un aumento de los encuentros entre personas y caimanes. Esta cercanía ha derivado en un incremento de conflictos con la especie y en prácticas no sostenibles como la caza por miedo o la sobreexplotación para el comercio de pieles. En consecuencia, muchas poblaciones de caimanes han sido reducidas, fragmentadas e incluso colapsadas, hasta el punto de que su uso fue prohibido en el país debido al riesgo crítico de extinción¹.

A partir de los años sesenta, se generaron herramientas legislativas para limitar

el uso silvestre y promover su manejo en cautiverio. En este contexto, la **zoocría** se proyectó como una alternativa para salvaguardar las poblaciones, producir individuos que pudieran ser reintroducidos al medio natural y acelerar su recuperación. Aunque estos esfuerzos enfrentaron ciertas limitaciones⁴, las poblaciones de caimanes aguja han aumentado durante las últimas cuatro décadas. Esto permitió que su estado de conservación a escala nacional pasara de Peligro Crítico (CR)⁵ a Vulnerable (VU)⁶, aunque también conllevó un incremento en los reportes de conflictos con comunidades locales⁷.



Las iniciativas comunitarias han demostrado ser estrategias efectivas para la **conservación** de la especie. Tal es el caso de la Bahía de Cispatá (Córdoba), donde la recuperación de las poblaciones de caimanes se asoció al trabajo de los pobladores locales⁸. Gracias a esta labor, la especie fue reclasificada de Apéndice I a Apéndice II en la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), lo que permitió a las comunidades hacer un **uso sostenible** de las poblaciones silvestres de caimán aguja en la zona.

Todo lo anterior evidencia la necesidad de seguir desarrollando programas que fomenten una interacción informada entre las comunidades locales y los caimanes. Esto supone comprender sus funciones dentro de los **ecosistemas** y aprender a coexistir con ellos a partir del conocimiento. Asimismo, revela oportunidades para diseñar estrategias que promuevan el uso sostenible de la

especie como recurso, permitiendo generar beneficios económicos mientras se avanza en su conservación.

Presencia estimada del caimán aguja en el Caribe

Presencia de caimán aguja
Área habitable
Ríos



Abundancia de poblaciones de caimán aguja registradas en el Caribe (1992-2011)

- Lugar**
- Bahía Portete (La Guajira)
 - Bahía de Cispatá (Córdoba)
 - Vía Parque Isla Salamanca (Magdalena)
 - Ciénaga de Zapatos / Ciénaga Costilla (Cesar)

VU
Caimán aguja
Crocodylus acutus

